

*Quelles sont les
conséquences
possibles de
l'avortement ?*

Pour commander :

Publications Vivere inc.

15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec)
J0W 1N0, Canada
Sans frais : 1 866 445-9695
Télec. : 1 877 787-0190
Courriel : vivere@bell.net
Site Web : www.vivere.info

Il est largement reconnu qu'une femme enceinte est doublement à risque, comparativement à la population en général, si elle doit subir une chirurgie.

Or, l'avortement est une chirurgie importante qui comporte au moins anesthésie, dilatation, succion et curettage. Ces interventions se font très rapidement ; elles exigent beaucoup de pression et plusieurs instruments, dont un couteau à dents affilées pour gratter agressivement l'utérus pour le vider du bébé démembré. Selon de nombreuses études, le tout mène à de graves conséquences à long terme dans une proportion importante de cas :

STÉRILITÉ dans 2-5 % des cas

CANCER DU SEIN risque accru de 30 %

CANCER : COL UTÉRIN, OVAIRE, FOIE risque accru jusqu'à 4 fois

ATTEINTE INFLAMMATOIRE PELVIENNE (AIP) dans 4 % des cas

SUICIDE risque accru 2-7 fois

GROSSESSES ULTÉRIEURES :

AVORTEMENT SPONTANÉ risque accru 2-3 fois

GROSSESSE ECTOPIQUE risque accru jusqu'à 8 fois

PRÉMATURITÉ/ MORTINAISSANCE risque accru 2-3 fois

CÉSARIENNE, ENFANT HANDICAPÉ OU MALFORMÉ risque accru 7-15 fois

Les façons dont l'avortement peut mener aux conséquences ci-dessus et les études scientifiques qui le démontrent sont présentées dans notre guide « *Éducation à la sexualité en Amérique du Nord* », qu'on retrouve sur notre site Web www.droitdesavoir.org.

*What are the
Possible
Consequences
of Abortion?*

To order:

Vivere Publications Inc.

15 Main Street North
Montcerf-Lytton, Quebec
J0W 1N0, Canada
Call toll free: 1-866-445-9695
Fax: 1-877-787-0190
Email: vivere@bell.net
Web site: www.vivere.info

It is generally recognized that a pregnant woman is doubly at risk, compared to the general population, if she must undergo a surgical procedure.

This being said, abortion is an important operation that involves at least anaesthesia, dilation, suction and curettage. These procedures are carried out quite rapidly; they require considerable pressure and numerous instruments, including a serrated knife to aggressively scrape the uterus to empty it of the dismembered baby. Many studies show that the above leads to serious long-term consequences in a fair number of cases:

STERILITY	in <u>2-5%</u> of cases
BREAST CANCER	<u>30%</u> increased risk
CANCER (CERVICAL, OVARIAN, LIVER)	risk increased <u>up to 4 times</u>
PELVIC INFLAMMATORY DISEASE (PID)	in <u>4%</u> of cases

SUICIDE	<u>2-7 times</u> higher than gen. pop.
----------------	--

FUTURE PREGNANCIES:

SPONTANEOUS ABORTION	risk increased <u>2-3 times</u>
-----------------------------	---------------------------------

ECTOPIC PREGNANCY	risk increased up to <u>8 times</u>
--------------------------	-------------------------------------

PREMATURITY/ STILLBIRTH	risk increased <u>2-3 times</u>
--------------------------------	---------------------------------

CAESARIAN/ HANDICAPED OR MALFORMED CHILD	risk increased <u>7-15 times</u>
---	----------------------------------

To know exactly how abortion may lead to the above consequences and the scientific studies that show this, consult our guide *Sex Education in North America*, in print or on line at www.abortinfo.org.